



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان قزوین

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه:

جهت دریافت درجه دکتری

موضوع:

بررسی شیوع ضایعات لیکنوئید دهانی در هزار نفر از افراد بالای
بیست سال شهر قزوین

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر کتایون برهان مجابی

نگارش:

فاطمه رضایی

سال تحصیلی ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲

شماره پایان نامه: ۲۴۳

خلاصه تحقیق

طبق تحقیق انجام شده در شهر قزوین، هزار نفر از افراد بالای بیست سال یکی از محله‌های شهر که حدود ۵۲ هزار نفر جمعیت داشته (بطور تصادفی)، مورد معاینه دهانی قرار گرفتند محدوده سنی افراد مورد مطالعه ۸۸-۲۰ سال بوده و میانگین سنی آنها نیز ۳۹ سال بوده است. که ۳۶۹ نفر آنان را مردان و ۶۳۱ نفر بقیه را زنان تشکیل می‌داده است.

معاینات ابتدا توسط پژوهشگر انجام شده و سپس در بخش بیماریهای دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی موارد مشکوک یا مبتلا به ضایعه توسط متخصصین بخش مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است.

نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از این است که حدود یک درصد از جمعیت مورد مطالعه مبتلا به ضایعات لیکنوئید بودند از این افراد ۰/۲ درصد مبتلا واکنشهای لیکنوئید وابسته به آمالگام بودند و ۰/۸ درصد مبتلا به لیکن پلان دهانی بودند.

همچنین شیوع ضایعات لیکنوئید ۱/۱ درصد در میان مردان و یک درصد در میان زنان برآورد شد و از کل افراد مبتلا، ۶۰ درصد را زنان و ۴۰٪ را مردان تشکیل داده بودند.

میانگین سنی افراد در گروه بیمار $13/2 \pm 47/1$ و در گروه سالم $14/9 \pm 38/9$ بوده است که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبوده است. ($p = 0/84$)

فراوان ترین فرم ضایعات لیکنوئید گزارش شده در این تحقیق نوع رتیکولر بوده و رایج ترین محل درگیری ضایعات لیکنوئید مخاط گونه بوده است.

همچنین در این مطالعه، هیچکدام از افراد، مبتلا به ضایعات پوستی نبوده و درد و سوزش همراه با ضایعات دهانی نیز از طرف هیچیک از بیماران ابراز نشد.